

SEBA
PL. ENLUMIN
ORDRE DE
MATIÈRES
OISEAUX
ET
POISSONS.

1051

SCD LYON 1

SCD LYON 1


SCD LYON 1

SCD LYON 1

1051/8

20220906

SCD LYON 1



SCD LYON 1

CONCORDANCE

du nom des oiseaux avec ceux qui
se trouvent figurés dans le cabinet de SEBA.

A

- ACAMACU.** de Seba, moucherolle
huppé, à couleur d'acier poli. Vol. V. p. 267
- ACOLCHI ou ACOLECHICHI,** de Seba;
rapporté aux Troupiales Vol. III. p. 228
- ATOTOLE** de Seba; oiseau pourpré à bec
de Grimpereau. Vol. VI. p. 357
- AVICULA.** Amboinensis canora de SEBA
Mélie d'Amboine. Vol. IV. p. 113
- AVICULA** de cacatotol, de Seba. Vol. 5. 147
- AVICULA** de chichiltotol, de Seba, Manakin
à tête rouge. Vol. V. p. 146
- Avicula.** de Pipistren. de SEBA. Ovette. Vol. V. p. 175.
- Avicula Mexicana** de chichiltotol. de Seba
Manakin à tête dor. Vol. V. p. 146
- AVIS Ani Mexicana** de Seba. Promerops
à ailes bleues. Vol. VI. p. 315.
- AVIS Paradisiaca Ternatana** de SEBA
Marka pécheur à longs bras. Vol. VIII. p. 72.
- AVIS porphyrio** ... ibidis species, de Seba
Courtis rouge. Vol. VIII. p. 583

B.

B. Rien de Seba sur cette lettre

C.

- CALATTI** de Seba Vol. V. p. 50
- COCHO,** de Seba, Guarouba (varieé)
Vol. VII. p. 219
- COQUANTOTE** de Seba, mal à propos
rapporté aux Manakins. Vol. V. p. 145
- CUCULUS Brasiliensis venustissime pie-**
tus, de Seba. Courcoucou, Vol. VI. p. 335

FRINGILLA.

FRINGILLA. Brasiliensis de SEBA.
veuve éteinte. Vol. IV. p. 348

H.

Mirundo marina indigena, de SEBA
Hirondelle ambree Vol. VIII. pag. 277

MOITTEILLIN. de Seba, oiseau rouge à bec
de Grimpereau. Vol. VI. p. 355.

K.

KAROPIT, de SEBA, sorte de Grimpereau
Vol. VIII. p. 47

M

MAIZI, de Micratorhynchus, de SEBA mal
à propos rapporté aux Manakins
Vol V. pag. 150

MOINEAU d'Amérique de SEBA, Tangara
bleu T. V. p. 35

N.

NYMPHE de Ternate de SEBA
Martin pécheur à longs bras. VI. p. 72

O

OOCOLIN. Species nici de SEBA —
Quereiva Vol. V. p. 168

OMNICOLOR ceylanicus de SEBA sou-
manga de toutes couleurs. Vol. VI. p. 345.

OTINTSCAN, de SEBA Arc en queue N. III
p. 229

P.

PICA Mexicana de SEBA, Epeiche
du Mexique Vol. VIII. p. pag. 406

PICA Mexicana, de SEBA, Epeiche du
Mexique Vol. VIII. pag. 406



6
CITATION DE SEBA.

P

PICIOTTE de SEBA; mal a propos rappor-
té aux Manakins vol. V p. 152

PINSON d'Afrique de SEBA, pinson—
jaune et rouge vol. IV p. 528

Q

QUATOETTE du Brésil de SEBA rappor-
té aux manakins vol. V p. 49

QUATREUILU de SEBA. En epier à tête
grise vol. VI p. 366

R

ROLLER huppe, du Mexique dans
SEBA ococolin vol. II p. 487

RONKAES, dans SEBA colibri VII. 33

RUBETRA de SEBA mal a propos rappor-
té aux Manakins

T

TALAO de SEBA vol. V p. 36

TATAE de SEBA, oiseau rouge à bec
de Grimpereau vol. VI p. 336

THAUMANTIA de SEBA et de klein;
rubis topaze vol. VII p. 230

TUIPE avis, de SEBA tout le vol. 32

X

XOXOUQUINHOETL de SEBA cra-
bier pourpré vol. VIII p. 232

Y

YAYAUQUITOTOTL de SEBA Brin-
bleu, vol. XII p. 41

1.051

100.031

OISEAUX,

*Qui se trouvent dans le Tome second
du cabinet de SEBA.*

*Rangés suivant l'ordre des planches; mais ensuite
par ordre alphabétique, ne pouvant faire mieux*



Aco.

Oiseau d'Amérique, nommé Acolechichi, noir et jaune. Scba tom. I tab. 55. n^o 4



Il a la tête noire, les ailes, le plumage des ailes et la queue noirs.
Le bec jaune du même que le dessus du corps et le dessous du corps. Le noir
des ailes est varié de petites plumes dorées.

Alcyon mâle, d'Amboine, qui porte une crête. SEBA Tom. I. tab. 63 n^o 4



Plumage de son corps mélange de verd, de jaune et de bleu
le bleu est celui de la turquoise. Pieds d'un jaune pâle.

Alcion oriental, huppé, superbe par ses couleurs. SEBA, Tom. I. Pl. 67. n^o 4



La tête, le col et le dessus du corps bleu céleste comme l'autre mer
nuancé de pourpre, ailes couleur de turquoise, les grosses plumes noires
et bleues. poitrine d'un jaune forte. bec d'un rouge pâle

ALC.

1 Pl. 53. fig. 3
et 2. Pl. 19. fig. 2

Anc. voy. PHAE.

Alcyon d'Amérique; ou l'oiseau qui se nourrit d'Abeilles. SEDA. Tom. 1. tab. 53 fig. 3
c'est une espèce de Martin-pecheur.



Bec blanchâtre, le tête et le col d'un rouge pourpré, la poitrine
et le ventre d'un jaune-pâle, les grandes plumes ^{de la queue} d'un gris ^{de la queue} contré les autres
plumes du corps et celles du col, d'un beau bleu. vague de pourpre sur les cotés.

Oiseau Colibri, d'Orient. SEDA Tom. 2. tab. 19. n° 2



d'un bleu foncé, devant du col est blanc.

AUT.

1. Tab. 46 fig. 3.
voy. 1. tab. 31. fig. 7

1. Tab. 51 fig. 7

voy. 1. Pl. 42.

Tab. 51. n° 6

[Redacted]

AUT.



AUTRUCHE d'Afrique; un des petits. SEBA Tom. I tab. 51. n° 6
Du Cap de Bonne-esperance.



+ de 2 mois Petit de grandeur naturelle.



plumes ou Poils du dos.



Plumes ou poils du dos.

La poitrine, le col et le ventre d'un gris foncé
les plumes du dos sont entremêlées de petits poils
noirs tirant sur le roux. les bandeslettes du col sont
d'un bas-^t obscur, la queue est blanche.
+ rouge brun

Oiseau Ayoquantototl charmant SEBA Tom. 2 96. no 4.
le plumage de couleur d'or



Bec noir, pieds roux-brun. Plumage de couleur d'or
ailes noires, bordées de blanc aux extrémités.

Oiseau ococolin, Espèce de Pie. Seba Tom. 2. Pl. 96. no 3.



son plumage est d'un noir débâne, varié ça et là de bleu éclatant. le bout de ces plumes
noires est coloré de ce même bleu. Sa gorge est d'un pourpre très vif. Ses ailes
son ventre et ses cuisses sont d'un bleu mourant.

CAL.

cacotolot roy MAL

Oiseau d'Amboine, nommé CALATTI, chinc grande beauté. SEBA. Tom I. Tab. 58. fig. 6



Nuage tirant sur le noir, autour des yeux et sur la poitrine regne un
tres beau bleu. Dos noir varié d'Azur. ailes clin bleu céleste, grandes plumes
vertes, bleu turquin et noir derrière du corps bleu pale mêlé de vert queue
clin brun sombre le bout clin roux grisâtre

CEY.

chichilatotl. roy. Noc

Oiseau de Ceylan qui paroit peint de toutes sortes de couleurs.
avec le nid de cet oiseau et ses petits. SEBA Tom. I tab. 69 n^o 9



D'un vert nuancé de toutes sortes de
couleurs parmi lesquelles l'or semble dominer.

COL.
Voy aussi. AIC

1. tab. 61. fig. 4.

SEBA Tom. 2. tab. XI. fig. 2

colibri ou l'oiseau suc fleur



Verd-lustré grandes plumes des ailes et de la queue
miratres

Oiseau de la Nouvelle Espagne, huppe sucant le miel des fleurs
et portant une longue queue. SEBA Tom. I N. 6. fig. 4.



Duin beau rouge. Ailes bleues.

COU.

Coucou du Brésil, coloré magnifiquement. SEBA. Tom. I. Pl. 66. n^o 2.



Bec clin rouge pâle. sa tête de la même couleur, crête clin rouge foncé rassie de noir dos clin rouge foncé, ventre clin rouge plus pâle parsemé de quelques plumes jaunes. les petites plumes des ailes sont en dessus clin rouge clair mêlé de jaune. les grosses plumes des ailes ainsi que la longue queue sont jaune foncé contre ombré de noir

~~Olivier Maitron, dit Durtal, dans l'ouvrage de la SEDIA, tome 1, 1966.~~

Friquet du Brésil. SEBA tom. I tab. 66. no 5°



duin gris centré obscur; mais la queue a son extrémité est duin roux clair
bec garni de petites plumes duin rouge pale, les ailes sont du même rouge
mélangé de jaune

Oiseau d'Amérique qu'on appelle Gonambicho. SEBA. Tom. I. tab. 110 no 6
commun à Surinam, chante mélodieusement comme le Rossignol



Plumage duin gris clair, les grande plumes des ailes sont grises par dessus
avec quelques mélange de rouge. Ses ailes supérieures et le dessus de la queue
sont rouge-pâle. Sa tête est grise

Grive noir du Mexique. / *Turdus niger Mexicanus.* } SEBA Tom. I tab. 65. no. 4



Le bec jaune, et les plumes du dessous de la queue blanche. La queue et le dos semblent peints de bleu en tout cet oiseau est noir.



Squelette de la Grive de nos pays. SEBA. Tom. 2. pl. 96. n° 6



Nid d'un Oiseau d'Amérique. SEBA. tom. I tab. 68 fig. 5
Lequel qui sort d'ouverture, a un couvercle garni d'une charnière que
l'on peut soulever au besoin. Il y a également un trou au milieu du nid, pour
l'introduction des aliments.

GUÍ.

Gonambucha voy. F.P.

2. tab. 5. fig. 4
1. tab. 6o fig. 5
2. tab. 3. fig. 4

Petit oiseau d'Amérique peint de diverses couleurs. SEBA. Tom. 2. tab. 3. no 3
haut de la tête rouge éclatant poitrine ventre gabet jaune doré. Ailes bleu d'azur dos mélange



Haut de la tête d'un très beau rouge, dessous des yeux plumes blanches et bleues, gabet poitrine et ventre jaune pâle et jaune doré, ailes d'un beau bleu dos par zones de bleu, brun, de blanc et de jaune

Nomme GUÍ GUÍT, petit oiseau de l'île de cuba. SEBA. tom. 1 tab. 6o. fig. 5
tête, poitrine, dos. D'un beau bleu,



Le quít-quít noir et bleu
Buff. ois. T. 4. P. 529

Certhia cyanea. Linnaeus

Plumes du col des ailes et de la queue très noires, celles de la tête, de la poitrine du dos, du ventre, des jambes d'un beau bleu les grandes plumes des ailes sont d'un bleu plus pâle. le bec est noir, le front est d'un bleu très clair mêlé de blanc on tout les couleurs sont douces les pieds jaunes.

Petit oiseau d'Amérique. SEBA Tom. 2. Pl. 3. no 4.
Tête noire, poitrine et ventre bleu turquin, dos et ailes verd gai,



Le grimpereau, vert à tête noire
Buff. T. 3. P. 633

Tête fort noire, bec blanchatre, poitrine et ventre bleu turquin, le dos et les ailes du verd gai plus foncé sur la queue.

HER.

Heron du Mexique. SEBA. Tom. I pl. 64. n^o 3



Il a le dessus de la tête et les deux coins des oreilles d'un rouge de sang, tandis que le reste de la tête, le col, le jabot et la poitrine sont mêlés de jaune et de verd-pale. le dos est d'un verd d'herbe obscur. les ailes sont d'un rouge-bai tacheté de taches blanches à la façon du Tigre. la queue est d'un verd d'herbe moucheté de noir; mais le haut de la queue est d'un jaune clair.

HER.

Heron du Mexique, ou l'oiseau nommé **Xoxouquihaachy**. SEBA. Tom. I
Tab. 64 n° 2.



Le plumage de son corps est d'un pourpre foncé. La tête est d'un rouge-bai clair et marquée de noir depuis le milieu du sommet jusqu'au col. les grosses plumes des ailes sont d'un rouge-bai foncé. Seba. ib

HER.

Oiseau rouge d'Amboine; ou Heron élein rouge de Corail, espèce d'ibis.

SEBA Tom. I. Tab. LXII. fig. 3
62.



Bec élein jaune roux, corps élein rouge-ponceau: le dos rouge très vif
rouge plus pâle. le bout des ailes bleu-bleue

n'est pas le courlis rouge du Brésil auquel il ressemble,
Buff. T. VIII. pag. 345, peut être une variété ou phénomène
n'est à pas une espèce ou variété de l'ibis blanc
d'Egypte Buffon T. XII. p. 267. Pl. 269

HER

Hirondelle roy. Mys.

Heron du Mexique espèce singulière. SEBA Tom.I tab. 65. fig. 2



Il est noir par tout le corps, excepté le
ventre et les ailes qui sont d'un gris lave
mêlé d'une espèce de couleur de feu. Seba. ib.

HOEXOTOTOL ou l'oiseau des saules. si l'est d'un beau jaune-clair; les plumes des ailes,
et du milieu de la queue, gris-foncé) SEBA Tom. I N. 61. fig. 1



jaune clair; les plumes des ailes et du milieu
de la queue, gris foncé, bec cendré jaune, les pieds
d'un gris lavé, les yeux rouges.

Nid de l'oiseau Hoitzitzillin, d'Amérique,
nommé autrement Papillon. SEBA. Tom. I. N. 68
fig. 2.



oiseau qui fait le nid ici à côté, c'est l'Hoitzillin,
ou Papillon charmant par sa couleur bleue et noire.

SEBA. Tom. I. pl. 61. fig. 5.

Sa queue et l'extrémité des
grandes plumes de ses ailes est
noire, le reste bleu.

Hoitzillan roy. Noe

Oiseau nommé Hoitzillan ou Papillon charmant par sa couleur bleue et noire.
de la nouvelle-Espagne.

SEBA Tab. 61. n^o 4. Tom. I.

L'extrémité des grandes plumes de ses ailes est de même que la queue
presque partout noire, le reste bleu comme l'indique le tableau.

Oiseau du Mexique, d'un blond-doré. SEBA. Tom. I tab. 99. n^o 4.



De couleur d'or, nuancé doré et de
diverses autres couleurs

Oiseau oriental, des îles Molucques, huppe
claire grande blancheur, nommé kakatocha. SEBA Tom 1 tab 39 fig 1
Cacatua sulphurea Gmel Syst Nat. 1. 330

KAK.



Petit kakatoes à huppe jaune.

Buff. Hist. Nat. T. VII. Pl. 75

Un appelle cet oiseau l'oiseau blanc
a cause de la blancheur de neige des plumes
de ses ailes de son dos, de sa poitrine et de
sa queue. Sous cette blancheur regne un
jaune de couleur de soufre. Sa huppe est
composée de longues plumes du même
jaune, lequel devient bien tâché sur les yeux
et sur le col. Le front est presque tout blan-
cheur, le bec entièrement noir et azuré.
Seba ib.

Petit Perroquet d'Amérique, peint de diverses couleurs
SEBA. Tom 2 tab. 40 no 1.



La moitié de sa tête et
de son col, sont d'un très beau
rouge, son bec est jaune roux

le derrière de sa tête, sa poitrine
et son ventre sont jaune verdâtre
il porte autour du col un collier
bleu céleste. Son dos et ses ailes
sont d'un vert sombre et
quelques plumes azurées : le bout
de sa queue est bleu, jaune, rouge
et brun, et de vert foncé

1. *Ful. 39. f. 9. 1.*
1. *Ful. 41. f. 9. 1.*

KAK

SCD LYON 1



LON.

et.

1. tab. 31. fig. 4.
1. tab. 46. fig. 4.



nest pas un oiseau
de Paradis Buff. T. III
page 172 à la note

SCD LYON 1

Discr. de Paradis, nommée TERNATANA.

SEBA. Tom. I. N° 46. n° 2

Bec jaune. derrière de la tête et les cotis du col bleu céleste devant du col, la poitrine, le ventre et le dessous de la queue très blanc. les plumes blanches de la poitrine et du ventre sont variées de bleu turquin. les ailes et le dos, bleu turquin très foncé le bout de la queue est blanche marquée de bleu clair.

1. Pl. 57. fig. 3
2. Pl. 96. fig. 5
3. Pl. 60. fig. 7.
4. Pl. 60. fig. 8
5. Pl. 57. fig. 4.

Oiseau nommé par les Brasiiliens MAIZY
de MACATOTOL. SEBA Tom. I tab. 57. fig. 3

Oiseau CACOTOTOL, au corps noir, à tête blanche
SEBA Tom. 2. " 96. no. 5.



D'un rouge vermeil; le tête et les grandes
plumes des ailes pourpre mêlé d'aurore. le bec et
les pieds d'un rouge obscur.



Son corps est noir, nuancé
de bleu turquo. bec noir
ainsi que les jambes

petit oiseau du Mexique qu'on appelle Chichitototl.
Seba Tom. I tab. 60. fig. 7



Noir et pourpre. tête d'un jaune doré ainsi
que ses pieds.

ne diffère du précédent qu'en ce que
sa tête est d'un rouge éblouissant.

Petit oiseau qu'on appelle de Pipizton. SEBA tom. I. tab. 57. fig. 4.

corps d'un rouge vermeil. tête et grandes plumes des ailes d'un pourpre
riche mêlé de nuances d'un jaune aurore éblouissant.



Corps d'un rouge vermeil, mais la tête et les grandes plumes des
ailes sont d'un pourpre riche mêlé de nuance d'un jaune aurore éblouissant
bec et pieds d'un rouge obscur.

MER.

Merle du Mexique. SEBA Tom 1. N. 69. no 5



Le merle du Mexique, Buff. Pl. ent. T. 3. Pag. 16.
Buffon cite cette figure, sans en donner une autre, il dit que
la partie supérieure du corps est d'un gris obscur mêlé d'une
tincte de roux et la partie inférieure d'un gris plus clair relevé
par des marques couleur de feu. Buff. 16.

Seba, ib. Dit que cet oiseau est d'un gris-brun, mêlé de roux;
les dessous du corps et les ailes sont diversifiés de couleur de
feu et d'un gris lavé.

MOI.

Oiseau du Mexique, rouge, et grand qui est une espèce de Moineau.

SEBA. Tom. I. tab. 63. fig. 1



Les plumes de la tête de la poitrine sont d'un rouge de sang
mais la queue et le grosses plumes des ailes tirent sur le noir avec
quelque mélange de noir rouge à la partie d'en haut

Oiseau du Mexique, de la grandeur du Moineau.
 Les ailes sont rouges et noires. Corps d'un beau bleu varié de pourpre
 SEBA. Tom. I Pl. 59 n° 4



Corps d'un beau bleu varié de pourpre. Ailes vermillon et noires
 queue contre râle de jaune. tête garnie d'un doré jaunâtre

Moineau d'Amérique. SEBA. Tom. I.
 tab. 67. n° 3. venu des îles Barbades
 tête et poitrine d'un bleu céleste.

Moineau d'Afrique, très-joli. SEBA. Tom. II tab. 65. n° 6
 vient de St Eustache. Ailes, queue Rouges. le reste citron. Estomac
 d'un rouge orange.



Dos très noir; ventre blanc; tête et poitrine
 bleu céleste. plumes de la queue et des ailes noires
 et pourpre clair, dessus de la queue verd foncé.

Se trouvent sur les rivages
 de la Hollande, mortes ou
 vivantes, elle sentent l'Ambre leur
 plumage est gris obscur.

Hirondelle de Mer de ce pays. SEBA. Tom. I. tab. 66. fig. 5.



MO~~T~~

Oiseau Motmot, du Brésil, clin rouge-bai. SEBA Tom. I tab. 67 n° 4.



Est clin rouge-bai (couleur de rouge brun)
le grande plumes des ailes sont clin bleu-verdâtre
bec bordé de quelques plumes noirâtres.

MOU.

Oiseau mouches avec leur nids. SEBA Tom. I tab. 68 fig. 7. 8. 9. 13



Fig. 7.

No. 7.



No. 7. 8. et 9. Tête et dessus du col élein rouge de rubis dessous du col et de la poitrine brillants comme la Topaze les ailes verd émeraude, bas ventre et queue grise blanche

Seba 68.



Fig. 8



Fig. 9

Fig. 12




Fig. 13



1. tab. 72. fig. 7

1. tab. 63. fig. 3

1. tab. 59. fig. 5

Mou

Oiseau de Virginie nommé de Atotot.

SEBA. Tom 1 tab. 72. fig. 7

est d'une couleur brune éclatante, chant doux et
mélodieux.



drin brun éclatant.



Petit oiseau du Mexique d'un bleu céleste.

SEBA. tab. 63. Tom. I. fig. 5.

Petit oiseau d'Amérique, oiseau Mouche,
de la plus petite espèce. SEBA Tom. I. tab. 59, fig. 5



Bec noir, plumage vert mêlé d'or, les grandes
plumes des ailes tirent sur le noir

MOU.

Petit oiseau du Mexique avec son nid. SEBA. Tab. 68, fig. 10. Tom. I.

I. Pl. 68. fig. 10
I. M. 68 fig. 10
D. 6.
id. fig. 11
id. fig. 12




est d'une fine mousse œufs
d'un bleu clair.

Plumage varié de jaune, de roux &c.

Le Nid vient d'un oiseau que les
espagnols nomment Tlapalototl. il
de la grosseur d'un chardonneret,
SEBA Tom. I tab. 68 n° 10.

Nid qu'on a trouvé dans un Atelier. SEBA Tom. I
Tab. 68. fig. 6

Nid d'un petit oiseau du Brésil.
SEBA Tab. 68 fig. 14 Tom.



Construit d'une mousse
cotoncuse



Les œufs sont bleus.



d'une fine mousse

Nid d'un oiseau inconnu. SEBA. Tom. I. Pl. 68. fig. 4.



NID.

Nid de l'oiseau du Mexique qu'on nomme Guira. SEBA Tom. I. pl. 68. fig. 3
au Bresil on nomme cet oiseau Tabinambi, il est de la grosseur de la Grive et
d'un beau plumage.



NOC.

Oiseau Nachtatotl, qui est de la couleur
du Moineau en Espagne. SEBA. Tom. I.
Pl. 42 fig. 5.

I. II. 42. fig. 3. et 6
I. II. 57. fig. 4
I. II. 60 fig. 8
I. II. 51. fig. 7.

Petit oiseau, du Mexique ou Holzillen. SEBA Tom. I Pl. 42 n° 6.



+ queue
gris-cendré brun.

Bec jaune, tête et col pourpre foncé mêlé clair
ventre et poitrine rouge incarnat. pieds jaunes ailes clés et +

L'oiseau colibri, d'Amérique, le plus petit de tous,
dit Thaumantias. SEBA. Tom. I. Pl. 57. no 4.



crête, rouge clair, gorge verte, poitrine, ventre
ailes des deux rouge incarnat, grosse plume des ailes
et de la queue tient sur le bleu pieds jaunes.

Autre Chichiltotl, du Mexique. SEBA Tom. I. Pl. 60
no 8



Tête pourpre, col couleur de
feu et rouge clair dessus du corps
ailes noirâtres, queue couverte
de cuivre rouge bord châtain.

sommet de la tête d'un rouge éclatant
en tout noir, parsemé de pourpre. jambes
pieds jaune clair

Oiseau de la nouvelle Espagne nommé Yayauhquitotl.
T. I. p. 84. Pl. LI. f. 7.



Ses grandes plumes de la queue
sont bleu ciel, jabot, contour du bec
et des yeux et dessus du corps bleu foncé
les ailes verd pâle le dos et les petites plu-
mes de la queue sont d'un vert obscur
ventre gris cendré, bec et pieds jaunes.

OCO.

oiseau qu'on nomme OCOCOLAN; ou Perdrix montagnarde du Mexique
SEBA. Tom. I N^o 64. fig. 1



Son bec est rougeâtre. Ses pattes
sont rouges comme du sang. les plumes
de sa crête et le plumage du corps est bri-
llant, doré, de bleu et de vert. les ailes sont
pointes d'un pourpre clair. les plumes des
côtes, le bout des maitresses plumes, et de
la queue sont tout à fait noirâtres. Siba il

OCO

vise au blond. roy. ETOI.

Nommé Ocotzindcan, de la grandeur d'une colombe.
il est d'un beau jaune. le tête et le col sont noirs.

SEBA. Tom. I tab. 61. fig. 3.



D'un beau jaune, la tête et le col sont noirs, les grandes
plumes des ailes noirâtres et ombrées d'un jaune pale. le
corps dessus et dessous est du même jaune avec quelques
nuances d'un jaune plus foncé. une bande noirâtre parcourt
en serpentant la longue et jaune queue. il est d'Amérique
a le bec jaune et le pieds gris

PAR

Pipizton. roy MAI

Tab. 63 fig. 1



Oiseau de Paradis, mâle d'Aroes, très grand rougeâtre. SEBA. Tom. I. pl. 63. fig. 1
on les apporte sans peines de l'île de Ceylan, et de Ténate. il est aujourd'hui très cher. Nos Dames
en placent sur leur coiffures.

les plumes du dos et des ailes sont d'un châtain clair par dessus, le bec couleur
de plomb le haut de la tête et du col sont citron, sous le col regne régne des plumes
d'un vert foncé très brillant

je le regarde comme une variété de l'oiseau de paradis de Buffon
T. III. Pl. 170. Pl. 182


Des 10 oiseaux représentés par Seba sous le nom étrangers de Paradis. il n'y en a que quatre qui
doivent être rapportés accéquemment à pl. 38 fig. 3, pl. 18 fig. 1 et 63 fig. 1 et 2.

PAR.

PAR

Tab. 63. fig. 2.

Oiseau de Paradis femelle. SEBA. Tom 1 tab. 63. fig. 2.



Oiseau de Paradis oriental, varie' de blanc et de noir. SEBA. Tom 1 tab. 62. fig. 3.



cet oiseau, dit Buffon. T. III P. 172
Et la variété dont la partie à l'article
des pieds.

sa tête et son col tire sur le noir ou brille sur rouge très vif, ses blanchâtre couvert de poils noirs
contour des yeux blancs corps très blanc, les deux grandes plumes garnies de petites plumes blai noires
ces deux grandes plumes sont à demi noires depuis leur commencement jusqu'au milieu, les pointes
lavées d'un rouge pâle, ongles blancs

PAR.

PAR

Tab. 60

fig. 1 - 2.



FAR.

PAR.

Oiseau de Paradis, de l'Amérique, qui est très beau. SEBA. Tom. I. tab. 66. fig. 5.
 Il a la tête et le col couleur d'or (des îles Barbades)
 La poitrine et le dos de couleur orange' pâle.



à la tête et le col dor, de même que le bec, qui est garni de petites plumes rouges
 les pieds sont jaunes. la poitrine et le dos d'un jaune orange' pâle. les grosses plumes
 des ailes et de la queue sont d'un rouge orange.

PAR

Tab. 30 fig. 5

PAR

Oiseau du Paradis, oriental, à crête, très rare.
SEBA. Tom. I. tab. 30. n° 3.



La tête et le col, ainsi que la crête sont très noirs.
la queue est d'un rouge clair, ainsi que les ailes et la
partie supérieure du corps, le ventre d'un centre clair
les pieds d'une couleur pâtonnée, ainsi que le bec

SCD LYON 1

PAP.

Oiseau de Paradis, du Brésil, hupé ou Cuiriri Acamaku.

SEBA Tom. 2 tab. 87 n^o 2



Dessus de son corps et de sa queue sont d'un rouge-maron clair
et sa tête, dessus de ses ailes et un jaune doré, son ventre et sa
poitrine blanches son bec rougeâtre.

SCD LYON 1

Perroquet d'orient, magnifique nommé LOERI. SERA. Tom. I pl. 38 fig. 4.



porte sur sa tête comme un ruban noir et une espèce de collier rouge et vert autour du cou. le gizier et la poitrine sont d'un très beau rouge clair; les ailes et le dos d'un magnifique bleu turquin, le ventre d'un vert foncé, parsemé de plumes rouges. la queue est colorée de vert et de rouge.

PER.

Espèce de Perroquet du Mexique nommé Cochito
tête rouge pale, col rouge orangé, dos jaune mourant queue
mélangée de vert et d'autres couleurs. SEBA Tom. I Pl. 64. n^o 4.



A la tête clin rouge pale, le cou clin rouge
orange, le dos clin jaune mourant, les ailes et
la queue mélangée de vert et d'autres couleurs.

PER

Petit Perrquet voy KAKNid du Perrquet ici à côté. SEBA Tom. I N. 68 fig. 1.

Espèce de Perrquet, du Mexique
du cocho. derrière de la tête, dos, ventre
et queue rouge écarlate foncé &c. SEBA
tom. I. Pl. 59. no 2.



Derrière de la tête, tout le dos,
le ventre, et la queue sont d'un rouge
éclatant foncé. les plumes du col
sont rouges et celles des ailes dein-
verd de poivreau. l'extrémité des
plumes est orné tout autour d'une
espèce de bord extrêmement blanc. le
front porte une petite crête pourprée
les yeux sont bordés de bleu. le
jabot et le bec sont jaunes foncé
les pieds gris cendré et les jambes
d'un bleu mourant.

Perroquet, rouge, petit, portant une crête. SEBA. Tom. I tab. 60. no 4



Garni de plumes d'un rouge foncé très beau, qui devient plus brun vers les deux côtés extérieur des ailes, comme aussi près du bec qui est d'un jaune clair; sa crête est d'un rouge vermeil. Ses jambes et ses pieds sont jaunes.

PHOE.

1. Tab. 67. fig. 1
1. tab. 48. fig. 3.

Phœnicoptere d'Amérique. SEBA. Tom 1 tab 67. fig. 1
Les plumes du corps de la tête, des jambes et des pieds sont d'un
rouge de Minium pâle, celles des grosses ailes tout à fait noirâtres




N'est pas le Flamant d'Amérique Buff. T. IX p. 322.
Pl. ent. n° 63.

Tête du Phœnicoptere de grandeur naturelle. SEBA Tom. 1. tab. 67. fig. 1.



Bec noirâtre par devant & le reste jaune.

L'oiseau ANI du Mexique à longue queue
SEBA Tom. 1. tab. 45. fig. 3.



Bec noirâtre, plumes d'un gris foncé changeant en vert de mer et en rouge pourpre
grosses plumes des ailes d'un bleu clair, le rebord les deux côtés du bec et le dessus des
yeux d'un jaune clair, queue d'un gris foncé avec du vert et rouge

PIE

PIE du Mexique. SEBA. Tom. I. Pl. 64. fig. 6



Dee blanchâtre, la tête et le dessus du corps, sont noirs
rare de plumes blanches, la poitrine et le bas ventre sont
gris de lin. le haut des ailes est blanc; mais leur grosses plumes
sont noires et blanches de même que la queue.

PIE

PIE du Brésil. SEBA. Tom. I tab. 66. n° 1



Ses cuilles
Sa tête, sa poitrine, son ventre et sont couvertes d'un duvet fort doux,
étoffeux, et qui jette un éclat de rubis. Ses pieds et son bec, sont jaunes
Les ailes sont variez exterieurement de châtain et de noir, interieurement
d'un jaune pâle, et ont leurs petites plumes d'un rouge foncé par dessus et
ont leurs petites plumes d'un rouge foncé par dessus; mais leurs grosses
plumes et la queue sont d'un bleu clair.

REY

Petit oiseau Royal, ou de Paradis, d'Amboine. SEBA. Tom. I. Tab. 58 fig. 5.



je le crois le manuscrit de Buffon
Tome III. p. 172. fig. 196, ce doit être une
variété.

Bec blanc. tête couleur citron foncé. tout le corps
le cou et la partie supérieure en dessus et la partie supe-
rieure des ailes d'un rouge très foncé. poitrine d'un rouge
éclatant les deux cotés de la poitrine d'un gris foncé,
et d'un cendré clair, colorées dans les extrémités d'un
vert émeraude fort chargé, le bout des ailes d'un rouge
clair, tout des 2 longues queue verdâtre.

Oiseau d'Amérique nommé Rubicilla; ou espèce de Rossignol de muraille.

SEBA. T. I. Pl. 102. no 4.



Tête huppée (ce qu'on ne voit pas dans la figure) d'une crête noire, bec blanc devant du col marqué d'une tache noire, poitrine et ventre bleus; dos sales et queue d'un rouge écarlate.

Petit oiseau, d'Amboine, très joli. SEBA
Tom. 2. Pl. 7. n° 2



Mélangé de rouge, de vert, doré et de pourpre.

Oiseau d'Amérique nommé Aubetra, orné d'une crête
crête jaune, queue et grosses plumes des ailes d'un bleu vénérable
le reste du corps jaune roux. SEBA T. 1. Pl. 102 fig. 1.



Crête et bec jaune. la queue et les grosses plumes
des ailes d'un beau bleu tandis que les petites plumes
sont d'un jaune pâle. autour du cou et sur le corps rouge jaune

Oiseau d'Amboine nommé Tsjoci ou Kakopit.

SEBA Tom. 2. tab. 62. n° 2



Plumes rouges sur la poitrine. Sur le ventre vertes, le col auverse
détour de la tête verd et jaune ailes dorées et rayées aux bords le haut
des ailes est d'un beau noir avec une bordure jaune, bec jaune

Petit plongeon d'Amérique n'ayant encore que le duvet.

SEBA Tom. 2. tab. 12. n° 8.



des sillonnés de rayes jaunâtres. corps gris obscur

TAT.

Thaumantias voy. Noz.

Petit oiseau Tatao, de la grandeur du Moineau, peint de diverses couleurs.
SEBA. Tom. I tab. 60. fig. 6.

- 1. tab. 60. fig. 6
- 1. tab. 36. fig. 6
- 1. tab. 99. fig. 4
- 2. tab. 70. fig. 3
- 1. tab. 53. fig. 4



plumage verd pâle, noir jaune et blanche le tout mélange. Tête et poitrine verd-pâle et noir. bec pieds noir.

Quatorzli, ou petit chardonneret du Brésil. SEBA. Tom. I tab. 36. fig. 6.



Moitié de la tête ornée d'une crête blanche col d'un rouge clair. Étonnante et ailes pour rouges foncé et pourpre. dos et queue noir mêlé et jaune ventre bleu et pattes fauve.

oiseau du Brésil, très-petit, huppé, qu'on appelle Picicity. SEBA. Tom. I. tab. 59. fig. 4



corps et ailes pourpre. crête jaune foncé queue rouge.

Coquantototl, petit oiseau huppé de la grosseur d'un Moineau, ayant si SEBA. Tom. 2. tab. 70. no 7.

oiseau d'Amérique nommé Chiltototl.
espèce de Moineau. SEBA Tom. I tab. 53. fig. 4.



Bec jaune, tache jaune au dessus des yeux, ailes aussi jaunes avec quelques plumes rouges grandes plumes cendrées. corps gris stomac et ventre jaune clair



Bec jaune, tête, dos et queue d'un rouge obscur col, poitrine, ventre et ailes jaunes. petites plumes des ailes d'un beau vert.

petit office du Mexique pour la circulation des lettres, telles que

Ternatana roy LON.

Oiseau Tsiocci, des Indes orientales. SEMA. Tom. I N^o 63. fig. 3
nommé aussi petit Roi des fleurs, on le dit de Macassar et de Baki.



Plumage varié de jaune doré, de blanc argentin, de verd et
plusieurs autres couleurs, milieu du corps et le bout des grandes ailes
jaune enflamé. bec blanchatre.

TUI.

Oiseau d'Amérique nommé Tuite (à cause de son chant) superbe par le mélange de ses couleurs. SEBA. Tom. I pl. 110 fig. 7.



Les grosses plumes de ses ailes et même de sa queue déployées sont peintes et comme marbrées de rouge, de jaune, de bleu et de blanc avec une bordure blanche. Sa tête est mélangée de pourpre et de couleur de rose, sa poitrine d'un jaune pale ombré d'un jaune foncé avec jaune, plumes rouges.

Oiseau XOMOTL d'Amérique, huppé. SEBA. Tom. 2. tab. 65. no 5.



Tête d'un rouge brillant, bec jaune marqué d'une tache noirâtre
semblable à celle qui est au coin des yeux. Dos et poitrine d'un rouge pâle
ailes le haut jaune-clair, le bas d'un rouge incarnat, il y a sous les ailes quatre
pinceaux écarlates foncés, queue nuancée de couleur de rose, de rouge éclatant,
et d'un beau jaune à l'extrémité

A des rapports avec le gaterin de Bohême. Buff. t. IV. p. 142. Pl. 261. mais il en
diffère quant aux couleurs comme la observe Buff. loc. cit; Mais il s'en rapproche
par les petites appendices rouges, qu'il porte sous les ailes

YTZ
Yyahquicatl. voy Noe

l. pl. 61. fig. 2.



Aigle de la nouvelle Espagne, petite espèce de corbeau
on l'appelle Yerquauithi. SEBA Tom. I Pl. 61, fig. 2.

+ le continuateur de

je laisse dit Buffon tom. III pag. 146 oiseaux est
est oiseau parmi les oiseaux de proie

Buff. T. I pag. 107 dit que cet oiseau est celui
que les français ont nommés Aigle d'orango, il a
pour caractère spécifique, les extrémités des ailes et
de la queue bordées d'un jaune blanchâtre, deux plumes
noires longues de plus de deux pouces et deux autres plus
petites toutes quatre placées sur le sommet de la tête +

Ses ailes et sa queue sont d'un verd-foncé superbe
et laissent voir des petites plumes ombrées d'un roux-clair
et comme découpées. Son plumage daïsleur est d'un rous-
centré. Feb. 16.

+ les jambes couvertes jusqu'aux pieds de plumes blanches et noires
posties comme des écailles, l'intérieur d'un jaune vif la peau qui couvre
la base du bec et les pieds jaunes, comme les aigles

POISSONS contenus

dans le cabinet de SEBA. Tome III et quelques uns, dans le 1er.

Les poissons, que SEBA. a fait figurer est précieuse et faite avec soin, cet auteur dans la Préface de son tome troisième nous dit que les descriptions qu'il en a donné et que nous regrettons de n'avoir pu copier ici, ont été faites en grande partie par le célèbre ARTEMI. qui eut le malheur de se noyer dans l'un des canaux d'Amsterdam le 27. Septembre 1735 ayant souffert chez SEBA dans le temps où il travaillait à la description de ses poissons.

Néançons pas sous la main mes auteurs Ichtiologue, je regrette de n'avoir pu ranger ceux ci, suivant un ordre méthodique; mais on pourra y Suppléer facilement en rappelant d'abord la nomenclature de chaque espèce d'après les citations, et ensuite formant une table qui renverra ici aux numéros des pages.

Espèce singulière de ver d'Afrique de la figure d'un serpent. SEDA Tom. 2. pl. 68 n^os. 7 et 8.
 Ces sortes de vers se trouvent en grand nombre au cap de bonne-Espérance, vers la baie de la table,
 dans les rivières, et entre les roches. Ils étaient nommés par les grecs Acheloi.



Dos, ventre jaune brun et bleuâtre le long
 des côtés du ventre, un dessous vendre jaunâtre

T. 2.
 SEDA Tab. Lxi. n^os 8 et 9



N° 8.



N° 9.

Dents molaires creuses et pérforées de certains poissous, elles sont connues sous le nom de couronnes de serpents.

ACT.Anatifa roy ACH

*Acipenser; corpore tuberculis spinosis aspero; Supinus. Acted. ichtyol
ETURGEON. Schr. P. 101. tab. 29. f. 19. Tom 5*

Acipenser sturio. Cuvier T. 5. P. 1483



Ne dit rien de sa couleur.

BAL

Balistes reticula roy ost
autre Balistes roy CEN.

Baliste à trois pointes sur le dos, et à queue fourchue.

SEBA. tom. 3. Pl. 24 n° 14.


Balistes reticula. LINN. Syst. N. T. 3. p. 1467



Ecaillles blanchâtres, elles sont
coupées par deux bandes blanches qui
accourent transversalement depuis le museau
jusqu'aux nageoires de la poitrine

Blennius varius; capite subacuto; extremitate pinnæ dorsali eminente.
SEBA. Tom. 3. Pl. 30 n^o 6

Blennius superciliosus. Gm. Sy. n. T. 3. l. 17 293



corps couleur clair brun

Blennius varius; capite subacuto; osseulus ultimus pinnæ dorsalis molibus
SEBA. Tom. 3. tab. 30. n^o 5. P. 90


Blennius superciliosus. gm. Sy. nat. T. 3. P. 178



corps couleur jaunatre avec des taches rougeâtres


*Blennius fronte perpendiculariter declivis;
osseulo primo pinnæ dorsali alto. SEBA Tom. 1. Pl. 30
n^o 5. P. 91.*

{ *Blennius fronte perpendiculariter declivis; pinnæ
dorsi in medio humili. SEBA Tom. 3. Pl. 30. n^o 4. P. 91*




rien sur sa couleur

*Blennius capite subacuto; pinnæ dorsi
tota acuta. SEBA. Tom. 1. Pl. 30 n^o 1. P. 90*




corps blanchatre avec des taches brunes et purpurines

*Blennius canescens; osseulus ultimus pinnæ
dorsalis molibus. SEBA Tom. 3. Pl. 30. n^o 2. P. 90*



corps de couleur grise ou cendrée



grisatre

Callionymus Lyra. Ann. Sy. nat. t. 433.

SEBA Tom. 9 Pl. 30. no 7. Ray. 92.


Gmel. Sy. nat. 5. Pl. 1152.



Iris des yeux argentés, la couleur est isabelle (couleur mitoyenne entre le blanc et le jaune, mais où le jaune domine. D'après)

Gunnellus cornubiensis; nonnullis Butterfish. Willoughby. P. n. 5
de vernouaille grise poisson




SEBA Tom. 9 Pl. 30 no 6




Iris jaune, couleur générale d'un gris sombre.

Cataphractus voy. Sc.

CEN.

Amphiselen cauda recta. SEDA. Tom. 3. tab. 34. no 5. P. 107*Centriscus tentatus*. Cm. sy. n. r. 3. P. 1460.*Toute sa surface est dorée**Solenostomus varius*, rostro ^{filato} cirrato; pinnis dorsali et ventralibus prolongis.
SEA. Tom. 3. tab. 24. no 4.*d'un beau jaune, avec des taches et lignes brunes.**Balistes varius*, daldo monacantho; rostra ^{cocho} sullo; macula nigra in extrema cauda.
SEA. Tom. 3. tab. 24. no 2.*une tache noire au bout de la queue, d'un gris jaune avec des taches plus foncées**Tetragonopterus argenteus*, capite grandi, exerto; ^{membrana adiposa} appendicula membranacea.
in extremo dorso; cauda multum bifurca. SEA. Tom. 3. tab. 24. no 5.
An SALMO?*Argento. oeil rougeant.*


SEBA Tom. III tab. 25. no 9. 1. 69
chaetodon rostratus. Linn. Sy. nat. 1. 168
chaetodon ocellatus. Gmel. Sy. n. 3. p. 1260



Corps blanc taches et
bandes noires

SEBA Tom. 3 tab. 25. no 11
chaetodon

SEBA Tom. 3. tab. 25. no 9
chaetodon striatus. Linn. Sy. nat
 Cuvier. n. T. 3. p. 1249




élin blanc plombé



corps blanchatre avec 4. bandettes noires

SEBA. Tom. 3. tab. 25. no 14
chaetodon.

SEBA. Tom. 3. tab. 25. no 10
chaetodon collare. Gmel. Sy. n. 3. p. 1263



élin blanc plombé ou pilote élin
blanc sale




Noirâtre avec deux
rayes blanches sur la
tête.

caruleus sibthorpi flavigans
 gmel. loc. cit

180 et 181 III et IV H.
Sur A laquelle sont indiquées les dates
de l'écriture de ces deux pages.


Larze

SEBA Tom. 3 tab. 25. n^o 5. a. p. 66. 65
chaetodon arcuatus. Linn. Sy. nat. 1. 462. Gmel. T. 3. p. 1245
 Habitat in Indis




noir quatre rayes courbes sur le dos

SEBA Tom. 3 tab. 25 n^o 8. p. 66
chaetodon macrolepidotus. Linn. Sy. n. 464 Gmel. p. 1247



deux grandes raies noires sur les cotés.

SEBA Tom. 3 tab. 25. n^o 7.
chaetodon canescens. Linn. Sy. n. 144
 Gmel. T. 3. p. 1246



Blanchatre, d'un blanc gris
 rebuitant

de la e nra. libell


de la e nra. libell

libell

SEBA Tom. 3. tab. 25. no 6

chætodon cornutus. Linn. Sy. n. 1. 461.

Habitat en Indiis. Gmel. 1. y. 13. p. 1242.



SEBA Tom. 3 tab. 25 no 2
chætodon nigricans. Linn. Sy. n. 1. 462
Hal. in ma


Rainures noires et blanches

SEBA Tom. 3 tab. 25. no 6


chætodon arcuatus. Linn. Sy. nat. 1. 462




les bandes sont jaunâtres ou jaunes.




SEBA tab. 25. Tom. 3. no 2
chætodon nigricans. Linn. Sy. n. 1. 462
Gm. T. 3. p. 1246



SEBA Tom. 3. tab. 25. no 1.
chætodon lineatus. Linn. Sy. n. 1. 463
Gm. Sy. n. T. 3. p. 1246




SEBA. Tom. 3. tab. 25. no 4.
chætodon triostegus. Linn. Sy. n. 1. 465.




les raies longitudinales sont d'un bleu blanchâtre,
et chacune des deux au milieu des 2 autres rayes brunes

Chætodon, couverture des onies un peu dentelé. SEBA. Tom. 3 Pl. 26. n° 24




rayé deux bandelettes noires sur les côtés, corps brun sombre avec deux bandelettes d'un blanc laiteux

Chætodon. SEBA. Tom. 3. Pl. 26. n° 22



corps brun sombre avec deux rayes blanches


Chætodon. SEBA. Tom. 3 Pl. 26 n° 25
Chætodon arcuatus. Gmel Sy. n. T. 3. p. 1250



corps argentin
Deux rayes brunes.

Chætodon macrolepidotus; canescens; linolis
grandes écailles longitudinalibus variis; linea fusca ad oculos,
pinnam dorsi, aui et caudæ. SEBA: T. 3 Pl. 29. n° 14.

Chætodon. SEBA. Tom. 3. Pl. 26. n° 20




son corps est d'un blanc sale avec 3 zones blanchâtres


Chætodon. SEBA. Tom. 3. Pl. 26. n° 26 pag. 100.




de couleur blanchâtre ligne brune entre les yeux et aux nageoires du dos et de l'anus
Chætodon macrolepidotus; macula rotunda et de grandes écailles ad caudam. SEBA Tom. 3. Pl. 26 ou 25 pag. 101. n° 37



écailles jaunâtres, ligne brune aux yeux, à la queue et à la nageoire de l'anus



Chætodon macrolepidotus, obscuré canus, lineis tribus, albis utinque, cauda bifurca. SEBA. Tom. 3. Tab. 29. n° 29. page 31.




d'un blanc plombé avec trois rayes blanches


sc. a. 18. c. 2. fol. 10. v. 1. 16. 17. 18. 19. 20.

SEBA. Tom. 3. tab. 25. no^o 15 — *Chatodon pinnatus*. Linn. Sy. n. 1. 461
Hab. in Indis. *Chatodon pinnatus*
Gm. Sy. n. T. 3. P. 124.

SEBA. Tom. 3. tab. 25. no^o 15
Chatodon




Blanc, écaillés argentées brillantes




Noiratre.

SEBA. Tom. 3. tab. 25 no^o 18 — *Chatodon vagabundus*. Linn. Sy. n. 465
Gmel. Sy. n. 3. P. 1252




Blanchatre. tache noire sur
les yeux, la queue et la nageoire du
dos et de l'anus.

SEBA Tom. 3. tab. 25 no^o 19
Chatodon octofasciatus. Gm. 3. P. 1262.




Blanc huit rayes noires.

SEBA tab. 25. Tom. 4. no^o 16
Chatodon capistratus. Linn. Sy. nat. 1. 465
Gm. Sy. nat. T. 3. P. 125




Blanchatre

Chætodon à queue accompagnée de deux aiguillons. SEBA Tom. 3. tab. 25. n° 3
Chætodon nigricans. gm. s.n. 3 P. 1245




Chætodon, ayant deux aiguillons, près des yeux. SEBA Tom. 3 tab. 26. n° 19




Un brun rougeâtre

Chætodon blanc sous le ventre, noir sur le dos, membrane des ouies entaillées de dents. SEBA Tom. 3 tab. 26. n° 25.




Chætodon. SEBA. Tom. 3. Pl. 26. n° 26.





Tout blanc, ailes et ventre sont noirs

Chætodon. SEBA. Tom. 3. Pl. 26. n° 27.



Tout blanc

Chætodon. SEBA. Tom. 3. Pl. 26. n° 37. Plg. 101




rayé de rayes brunes longitudinales, son corps est blanc vergé de rayes brunes longitudinales, nageoires du ventre noires.

Chætodon. SEBA. Tom. 3. Pl. 26. n° 32



deux raies blanches longitudinales



blanc, nageoires du ventre et du dos sont noires au bout

Chætodon. SEBA. Tom. 3. Pl. 26. n° 31




Grandes taches blanches. Son corps est brun, les nageoires du ventre et du dos, sont blanches

Chætodon. SEBA. Tom. 3. Pl. 26. n° 30.
il est de la longueur d'environ un pouce.


blanc, tacheté de brun



Se trouve en Amerique dans les eaux de Surinam. le dos est d'un brun noiratre et le ventre est d'un blanc tirant sur le jaune, avec quatre raies noiratres. le dessus de la tête est brun mais elle devient d'un jaune éclatant sur les côtés. les yeux sont d'un jaune luisant sur des orbites foncées. nageoires brunes



Globe de l'œil.




orbite de l'œil un peu renversé



globe de l'œil



cristallin



Tête de ce poisson



dessous de la tête.

Anableps, lineis quatuor longitudinalibus ab utrinque latius; processu tubulato ad pinnam. aui. *SEBA*. Tom. II. tab. 34. no 7. Ley. 1682.
Cobitis *Anableps*. Ann. Sy. nat. 1. 499 hab. America aquæ Surinami et Illequeba.
Com. Sy. nat. T. 3. P. 134. 8


Anableps, lineis quatuor longitudinalibus ab utrinque latius; processu apponitico.

Aube cottus roy. Sco.

COT.

Cottus alepidotus, varius; maxilla inferiore, cirrata. SEBA. tom 3. tab. 28 no 4. p. 80
sans écailles *barbeue*

Cottus grunniens. Gm. Sy. n. T. 3 p. 1208



La couleur est mêlée de brun, de rougeâtre et de blancheur. Les nageoires de la poitrine sont marquées de diverses couleurs. celles du ventre sont blanches.



Diodon hystrix Linnaeus 1758 p. 1450

Cuvier Tom. 9. tab. 23. n° 1
Porc-épée vu en dessus. dessin de monsieur Admetius


autre édition, very TEE

old

1794

SCD LYON 1

DIO.



Porc-Epi, des mers de l'Amérique, SEDA. Tom. 3 tab. 23. no 1.
vu en dessous.


Diodon reticulatus. gm. sy. n. 3. 1449

Les pointes du dos sont et quadrées { diversifiées de couleurs } de châtaignier
son ventre est blanc; pointes châtaignier

DIO.

*Porc-Epi de Mer, hérissé de pointes à trois racines
SEBA. Tom. 3. tab. 23. n^o 3*

Diodon reticulatus. Gm. t. 3. p. 1450




*Tetradon ocellatus. Gm. t. 3. p. 1445
SEBA. Tom. 3. tab. 23. n^o 7*

Tetradon ocellatus. Gm. t. 3. p. 1445

*Le même que celui qui précède, vu en dessous n^o 4
SEBA ib.*



*Sa couleur quand il sort
de l'eau est molangée de
rouge et de noir, tubercules
noirâtres*



CIVI

Gymnotus varius, rostro producione. SEBA Tom. 3 Tab. 32. no. 5. p. 99.
Gymnotus rostratus. Ann. Sy. nat. 1. 1820.

Gymnotus rostratus
gmd. T. 3 p. 1139

Roule abr. Mouche de grandes
taches brunes



REMORE. Seba. Tom. 5. tab. 33. n^o. 3. p. 105
Echincis, ore triangularis, cauda in extremo subrotunda;
lineis duobus fuscis, longitudinalibus, a rostro ad caudam
usque protensis. Seba. ib. Echincis Neucrat's. Gm. S. n. 5. p. 1189



Les nageoires et la queue
brun foncé celle du dos est plus claire
le reste est claire couleur ivoire.

en 1800 date est 1800. ALPHONSE

et son fils Charles Gauthier n'a pas été
identifié avec certitude.

Gobius roy PLT.

GYM.

Gymnophorus roy CAL.

5. Tab. 34 fig. 6.

Gymnotus nigricans; capite plagioplate; cauda curva, obtusa;
Virtute TORPEDO. SEBA Tom. 3 tab. 34 no 6 pag. 108

Gymnotus electricus. LINN. Sy. nat. 1. 427. Gmel. T. 3. pag. 1158



nouratre.




n°1 Gymnotus, lineis transversalibus varius; maxilla inferiore longiore,
cauda curva, subulata. SEBA Tom. 3 tab. 32. n°1 Gmel. Sy. n. T. 3

jaune clair jaune varie de
lignes brunes

Tout son corps est jaune clair, varie de
lignes brunes

Gymnotus fasciatus. Gmel. Sy. n. T. 3. Pl. 1137

n°2. Gymnotus varius; capite conico; ventre turgidior. SEBA Tom. 3 tab. 32. n°2



est bleu
de tête à Amboine

n°3 Gymnotus caeruleoalbus; ventre laticore; macula nigra ad branchias. Tom. 3. Tab. 32. n°3

Est bleuatre ayant le dos noir, la queue variee de blanc et de noir

Gymnotus albus gmel. Sy. nat. T. 3. Pl. 1137

On ne sait pourquoi il la nomme albus.

GYM.

3. tab. 32. n°3

Gymnotus nay. n.

Gym.



Gymnotus carapo. LINN. Sy. n. 1427. SEDA. Tom. 3 N. 32. n^o 4. Aug. 99.
Gymnotus fuscus; maxilla inferiore brevior; dorso ad caudam usque sulcato. SEDA. id.


Gmel. T. 3. l. 1136

Bruel ou roux

SCD LYON 1

Holocentrum ou Poisson tout semé de piquants. SEBA, Tom. 3 N. 27. n^o 1

Page. 79



Son corps est d'un blanc argentin brillant, nageoire de la poitrine blanche ainsi que les autres

Scomber, linea laterali aculeata; pinna ani ossiculorum rigente.

SEBA Tab. 27. Tom. 3 n^o 3. pag. 76.



nageoires du ventre
blanches

iris jaune, son corps est argentin mêlé de jaune un peu doré

Percus maxilla inferiore longiore, tota maculata
et lineis transversis varia. SEBA Tom. 3 tab. 27 n^o 15. P. 78

Grammistes. SEBA Tom. 3 N. 27 n^o 5. P. 75




nageoires de la poitrine blanches ainsi que les autres.

Percus oblonga teres; lineis utrinque octo transversis fuscis.
SEBA Tom. 3. tab. 27. n^o 16

Page 78

son corps est rougeâtre, avec des raies blanches nageoires. idem
Percus maxilla inferiore longiore; lineis longitudinalibus
varia; pinna dorsi aculeorum undecim. SEBA Tom. 3. tab. 2

n^o 8
P. 76



sillonnée en travers de huit rayes brunes. corps blanchatre
nageoires de la poitrine blanche

Percus coloris argentei; lineis utrinque longitudinalibus;
cauda bifurca. SEBA Tom. 3. tab. 27. n^o 19.


les rayes longitudinales sombres

Écailles argentines avec deux petits sillons rouges pale
queue blanche



Labrus polyodon; capite coeruleo; cauda bifurca.


SEDA. Tom. 2. tab. 21. no 7



tête bleue ^{foncee}, écaillés blanches, sa couleur est nacée de blanc de verdâtre et quelque tincture de bleu pale

Labrus tetraodon; nigrescens, maculis albis singulariter varius.


SEDA. Tom. 2. tab. 21. no 2.



vertâtre, pointillé de taches blanches, couleur de lait.

Labrus polyodon; lineis utrinque diibus longitudinalibus; cauda aequali.


SEDA. Tom. 2. pl. 21. no 5.



le dessus de sa tête est bleu, barré de trois rayes d'un bleu argente, queue blanche ainsi que les nageoires

Labrus polyodon; varius; macula coerulea ad basin pinnarum pectoralium


SEDA. Tab. 21. Pl. 21. no 6



de diverses couleurs, ayant une tache bleue vers l'origine des nageoires de la poitrine


LAB.

*Labrus polyodon; virescens: puma dorsi aculeorum decem.
SEBA Tom. 3 tab. 31. no 4 pag. 95*




couleur tirant sur le vert

*Labrus polyodon; lineis utrinque duabus longitudinalibus; cauda aequali.
SEBA Tom. 3 tab. 31. no 5 pag. 95.*




le dos de la tête est bleu. d'un blanc argenté

*Labrus varius; maculis duobus nigris post initium pinnar' dorsali.
SEBA Tom. 3. tab. 31. no 8 P. 96*



de diverses couleurs, avec deux taches noires après le commencement
de la nageoire du dos. sa partie moyenne supérieure est d'un brun foncé, l'inferieure
est jaunâtre

Labrus tetraodon; unicolor; cauda aequali. SEBA Tom. 3 tab. 31. no 1



iris jaune, yeux blanchâtres, couleur grise ou jaunâtre

Rana piscatrix, Americana. SEBA. Tom. I. tab. 74. fig. 3. p. 118

Lophius histrio. GIN. T. 2 page 1487 il regarde les autres
qui sont sur cette planche comme des variétés.



Est dein blanc luisant, couvert de taches rouges et de taches noires aux nageoires

Rana piscatrix, Americana, cornuta spinosa. }
SEBA. Tom. I. tab. 74. fig. 4. }

Pulchra Rana piscatoris spinosa.
SEBA. Tom. I. tab. 74. fig. 5.



Rana piscatrix, Americana quarta.

SEBA. Tom. I. tab. 74. n° 6.



SEBA. Tom. I. tab. 74. n° 7
Scyllaea Pelagica. Linn. Sy. nat. P. 2147

SEBA Tom I tab. 74. n° 7




est commune dans le fucus natans de presque toutes les mers. cur. Reg. anim. T. 2. p. 297. cet auteur place les scyllées (*Scyllaea*) parmi les gasteropodes nudibranches.

Rana Piscatrix, Americana, marina, ex Curassoa. SEBA Tom. I tab. 74. n° 2.

Lophius vesperilio. Gmel. Sy. n. T. 3 p. 1431.

ne se mange pas. debil

Lop.



ne dit rien sur sa couleur.

Mystus voy. PL. 0.

MUR.

2 tab. 69 fig 3
ct 2

Mou

Murena maxima orientalis singularis. SEDA Tom. 2. tab. 69. n^o 3



d'Ambeine.

Murena Helena. Linn. sy. n. p. 423

son corps gris cendré, mêlé de taches vertes pâles ou ponceau
deux courtes blanchâtres séparent sur les côtés du corps le ventre
et les nageoires jaunâtre



Murana seu Conger Africanus. SEDA Tom. 2. tab. 69. n^o 2

Le dessus de son corps est marqué de rhombes cendrés rouillés avec clartés
brunâtres. ventre blanchâtre

Muraena, seu conger, Brasilensis mas. SEBA Tom. 2 tab. 69. no 4.
Muraena Helena. Linn. LA MURENA bonne à manger.
Gmel. S. nat. T. 3. 1152.



— sa peau brune sombre, a de grande taches verdâtres.

— *Muraena; femina.* SEBA ib. no 5. Gmel. S. nat. T. 3. 1. 1152
Muraena Helena. Linn. LA MOURENE




MUR.



Partout semé de taches roussâtres

Ostracion. Poisson Coffre. SEBA tom. 3. tab. 24. n^o 6.



Ostracion triqueter. Gmel. 3. P. 1440


Ostracion. Poisson Coffre. SEBA tom. 3. tab. 24. n^o 12.

Ostracion triqueter
Gm. T. 3. P. 1441



Taches blanchâtres.

Ostracion. Poisson Coffre. SEBA tom. 3. tab. 24. n^o 5.
Ostracion cubicus. Gm. 3. P. 1442



Ses dents sont jaunes, safran.


*Ostracion, ou Poisson coffre ayant sur la tête deux pointes
et deux sur le ventre. SEBA Tom. 3 tab. 24. n^o 4.*

Ostracion cornutus. Gmel. T. 3. p. 1443



Ostracion ou Poisson coffre. SEBA Tom. 3. tab. 24. n^o 14


Ostracion cornutus. T. 3. p. 1443



Jaunatre


Ostracion ou Poisson coffre. SEBA Tom. 3. tab. 24. n^o 3

Ostracion bicaudatus. Gmel. Sy. n. T. 3. p. 1441



Ostracion ou Poisson coffre. SEBA Tom. 3. tab. 24. n^o 9

*Ostracion tricornis. Gmel. T. 3. p. 1442 ne peut être le
c'est une variété du cornutus tricornis*



clun blanc sale, tirant sur la couleur
de la boue.

Ostracion ou Poisson coffre. SEBA Tom. 3. tab. 24. n^o 6

Ostracion cubicus. Gmel. Sy. n. T. 3. p. 1443



taches noirâtres

*Ostracion ou Poisson-coffre sans pointes.
SEBA Tom. 3. tab. 24. n^o 11.*



des taches blanchâtres
Sa couleur est un blanc gris
nuance

S. 146-24. fig. 1. 2. 19
17-19. 15. 10

Ostracion, rond de corps barré de rayes noires sur le dos et
armé de piquants très-forts. SEBA. Tom. 3. tab. 24. no. 1.



Son dos est brun obscur, avec de larges raies noires
tout le dessous de son corps est blanc

Ostracion, rond blanc à courtes pointes couchées
SEBA tom. 3. tab. 24. no. 2.





Tout blanc sous le ventre, et le
dos d'un brun rougeâtre, toutes
ses nageoires sont blanches.

Baliste ayant deux pointes sur le dos
et très-petites épines sur les écailles. SEBA. tom. 3.
Tom. 3. tab. 24. no. 17

Baliste, dentelé de pointes dans la partie
postérieure de la nageoire du dos. SEBA. Tom. 3.

Balistes capricornus Tab. 24. fig. 16.
g. m. S. n. P. 147.




Tout son corps est blanc

Baliste à trois pointes sur le dos et à trois rangs
de petites épines couchées sur le dos. SEBA. Tom. 3.


tab. 24. no. 16
BALISTES ACULEATUS.
g. m. P. 1466

Son corps noirâtre
au milieu avec des
raies blanches




Baliste, couvert d'épine. SEBA. Tom. 3. tab. 24. no. 16.


Dos noirâtre queue
blanche à l'extrémité



Baliste au museau long pointu ayant sur le
bas ventre une tache noire picotée de points blancs
SEBA. Tom. 3. tab. 24. no. 19.



Sa couleur blanchâtre est ombrée d'une tache d'un brun
Ostracion couvert de grandes pointes. SEBA. Tom. 3.
Diodon Atinga. g. m. P. 1451 Tab. 24. no. 10.



Ventre blanchâtre et son dos noirâtre

Balistes capricornus. g. m. P. 147.

*Perca maculosa; maxilla inferiore longiora;
pinna dorsi aculeorum novem. SEBA. tom. 3. tab. 27. no 6
Pag. 66. 75.*

*Perca maxilla inferiore longiore, transversim lineata;
macula nigerrima ad caudam. SEBA. Tom. 3 Tab. 27. no 6
1. 76 no 6*



couleur blanche, avec
des bandelettes brunes
la tache très noire

Le corps et les nage-
oires macrés, de ta-
ches brunes et noirâtres.


{ macré diversifié de }
couleur

Perea unicolor, maxilla inferiore longiore;
macula nigra ab basim caudæ. SEDA. Tom. 3. tab. 27


no. 10 p. 76

Perca maxilla superiore longiore, lineis
longitudinalibus varia; aculeis dorsi tredecim.

SEDA. Tom. 3 tab. 27. no. 17. p. 78.



corps blanchâtre
raies noirâtres. nage.
vires de la poitrine
et du ventre. blan-
ches



corps brun blancha-
tre.

Perca tota maculis fuscis et punctis albis varia;
penna dorsi aculeorum undecim. SEDA. Tom. 3 tab. 27

no. 7 p. 76



Pointille de taches
= blanches
les taches dont celle
est marquée sont
surcées de points blancs,
ce qui leur donne une
figuré pentagonale.

PENTANEMUS. Seba. Tom. 5 tab. 27. n^o 2. p. 73. et 74

Polynemus quinquarius Gmel. Sy. n. T. 3 p. 521
Gmel. T. 3 p. 1400



Iris de l'œil argente, corps élégant blanc argenté, nageoires blanches

*Perca maxilla superiore longiore: lineis longitudinalibus varia;
oculis clorsi decem.* SEBA. Tom. 2. tab. 27. no. 16.



son corps est blanc rejeté de rayures bruns rougeâtre

*Perca maxilla inferiore longiore; albescens
cum lineis transversis obscurioribus.* SEBA. Tom. 2. tab. 27. no. 14.

*Perca maxillis æqualibus. capite maculoso;
cauda æquali.* SEBA. Tom. 2. tab. 27. no. 12.



Corps blanc ^{argentin} avec des rues de couleurs sombres
nageoires du ventre et de la queue blanches



corps blanc sale jaspé de
taches noirâtres taches de latéh
brunes

*Perca maxillis æqualibus, lineis utrinque clavatis, transversis,
nigricanibus.* SEBA. Tom. 2. tab. 27. no. 11.



corps de couleur babelle, nageoire de la poitrine blanche, celles du ventre noirâtre

Scomber flavescens, latitudine ad longitudinalinem dimidia denticulis piliformibus.
SEBA. Tom. 2. tab. 27. no. 4



Jaunette

Mystus cirris duobus exiliis; pinnis pectoralibus
oculo electutis. SEBA Tom. 3. tab. 29. no 8 P. 35

Plecostomus cirris plurimis; aculeis unguiformibus
ad aperturas branchiarum. SEBA Tom. 3 tab. 29 no 12.



nageoires de la poitrine noitatre ainsi que celles du ventre.



Plecostomus cirris duobus; cauda bifurca.
SEBA Tom. 3. tab. 29. no 11 P. 47



rien sur sa couleur.

rien sur sa couleur

Plecostomus corpore aculeato; ore cirtato
dorsu monopterygia. SEBA tab. 29. no 14 P. 18 T. 3




corps blanc

Gobius ex nigricante varius: pinna dorsi secunda.
osculis 14. constante. SEBA Tom. 3. tab. 29. no 15 P. 88

Gobius albescens; osculis pinnae dorsalis prima
præalitis et latiformibus. SEBA Tom. 3 tab. 29 no 16 P. 89

Gobius niger. Gm. Sy. n. T. 3. P. 119

couleur noire, picotee



corps blanc, ou gris blanc

SCO.

3. Pl. 28. fig. 1

scomber roy. Hol
autre scomber. roy aussi Hol

Coltus squamosus, rastro bifido; pinnis pectoralibus
aut caudam extens. Seba tab. 3 pl. 26. fig. 1. p. 79

Scorpaena valitans. T. 5 p. 79 t. 28 fig. 1 p. 121.
an potius Scorpaena antennata? Grimaldi esp. Linnaeui



Suivant Grimaldi loc. cit. la pupille noir; avec l'iris blanche cerclée
des rayons bleus et noirs. les rayons dorsaux roux et fauves le
reste est noir maculé de rouge. les nageoires ventrales sont
violettes marquées de blanc, ainsi que les pectorales

Scyllæa vry. lop. SCO.

P. 3. Pl. 23 fig. 2


SEBA. Tom. 3. Pl. 28 n° 2.
chabot couvert d'écailles de diverses couleurs portant
des aiguillons aux mâchoires aux narines et à la ligne latérale
SCORPION ou SCORPENO de Salvian pag. 197. Willoughby pag. 331

Scorpana scrofa. Cm. T. 3. P. 1215



La couleur mêlée de noir, de rougeâtre et de
blanchâtre est assez vilaine.


Chabot 8e SEBA Tom. 3. Pl. 28. n° 3



La couleur est mêlée de brun
de noirâtre et de blanchâtre le tout
assez laid.


chabot sans écailles tête armée de piquants SEBA Tom. 3. Pl. 28 n° 5
scorpene de Rêlon Pag. 242. de la mer Baltique.

Cottus scorpius. Cm. sy. n. T. 3. P. 1211



iris de lœil est d'un rouge foncé. La tête, son dos, ses cotés et ses nageoires sont vergées
de taches ou rainures noires et jaunes ou rouges ou blanches

^{armé de toutes pieces}
CATAPHRACTUS. Jonston Pag. 77. Pl. 46. fig. 5. 6
SEBA. Tom. 3. Pl. 28 n° 6.



rien sur la couleur

Mystus maculosus; cirris sex longis: capite longo, plano. SEBA. tom. 3. II. 29. n^o 6. p. 84

Silurus fasciatus. gmr. sy. n. T. 3
Pag. 1359



dessous du corps blanc. corps jaunatre
nageoires blanches

Mystus cirris sex longissimis, appendice dorsi a pinna ani ad caudam extensa.
SEBA. Tom. 3. II. 29. n^o 5




corps jaunatre, nageoires blanches

*Mystus, ore in apice capitis; cirris octo. SEBA. Tom 3
tab. 29. n^o 2.*

*Mystus argentei coloris; cirris sex: pinna
ani obliquorum. SEBA. Tom 3. tab 29. n^o 3*



rien sur la couleur



couleur argentine

Mystus, ore subtilis; cirris octo: appendice in dorso. SEBA tom. 3. tab. 29. n^o 1.



blanchatre mélange de brun clair

Mystus cirtis sex; appendice dorsi carnis.
SEBA. tom. 3. tab. 29. no 9.



Mystus cirtis octo; appendice dorsi carnis. SEBA. tom. 3. tab. 29. no 10.

Silurus Aspredo. Linn. Sy. n. T. 3. p. 1555




Plecostomus cirtis quatuor longis. SEBA. tom. 3. tab. 29. no 15
Silurus callichthys. Gm. Sy. n. T. 3. p. 1561



Mystus cirtis sex; cauda in ^{au bout} extremo aequali.
SEBA. tom. 3. tab. 29. no 10.

Silurus galeatus. Gm. T. 3 page 1557



iris bleu, corps cendré avec taches noirâtres

Mystus cirtis sex longissimus; appendice triangulare in extremo dorso. SEBA. Tom. 3. tab. 29. no 4.



Squalis varius; naribus ori proximis; foraminibus pone oculos; spiraculis utrinque quatuor; cauda longissima. SEBA Tom. 3. tab. 34. n. 1

Squalis tigrinus. Cm. T. 3. P. 1493
et *longicaudus.* —————— g. m. P. 1476



à des lignes blanchâtres qui s'étendent suivant la longueur de son corps et des taches réparties de tout côté sur un fond roux. seba.

niger maculatus fasciisque nigris subhis convescens. g. m. P. 1493

TET

3. Tab. 23. fig 5.6



4. et 9.

autre Tetrodon voy. Dio.

Poisson rond à tête de Lièvre de Grew. SEBA. Tom 3. Tab. 23 n°5 et 6
Tetrodon lineatus. Cml. T. 3. P. 1444.

n° 6 en dessus

n° 5. en dessous





Dor lisse barré de longue raies
horizontales châtais

Diodon Hystrix. Cml. T. 3. P. 1449

Part. epi de mer. SEBA. Tab. 23. n°4.
Willoughby. pag. 155. Ray. pag 42

Autre espèce. SEBA. Tab 23. Tom. 3 n°9.



SEBA. Tom. 3. Tab. 53. fig. 1 P. 102
Trichiurus lepturus. Linn. Sy. nat. 1. 420
Gmel. Sy. nat. 7. 3. P. 1141

Argente, excepte les yeux et la nageoire



TRI.

Le Milvus, ou Milan de Mer, du Poète Ovide dans son
fragment sur les Poissons, vers 95 SEBA Tom. 3 tab. 28. n^o 7.

Hirondelle de Mer. Rondelet liv. x ch. 1. pag. 281. les habitans
de Sicile et de Malthe le nomment Salcone. voy. Willoughby.

Trigla volitans. Linn. Sy. n. T. I. p. 198

Gmel. Sy. n. T. 3 p. 1346




ne dit rien sur sa couleur.

ZEU:

Poisson Abucatuaia des Brésiliens nommé aussi Poisson gallo. SEBA Tom. 3. tab. 26 n^o 34. p. 72.
Müllgraff liv. 2 chap. II. Willoughby. 1^{re} 295. Aug. p. 99.

Zeus Gallus. Gm. S. nat. T. 3. p. 122.



Son corps est d'un brillant argentin

SEBA tom. 3. tab. 26 n^o 31.



De couleur argentine ainsi que
les espines



SCD LYON 1

SCD LYON 1